

APICIFICAÇÃO, COM TAMPÃO DE MTA, EM UM INCISIVO LATERAL SUPERIOR TRAUMATIZADO

Alícia Costa Santos*, Maria Antonia Silva, Eduardo Fernandes Marques, Diana Rodrigues Frota
Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC/ITPAC

Resumo

O tratamento de dentes jovens traumatizados requer atenção especial, devido à possível presença de ápice incompleto e paredes dentinárias delgadas, o que pode dificultar ou comprometer o tratamento endodôntico convencional. O objetivo deste estudo é relatar um caso clínico em que foi realizada apicificação, com tampão de MTA, em um incisivo lateral superior traumatizado. Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, 21 anos de idade, procurou a clínica do ITPAC – Porto Nacional, relatando, como queixa principal, tratamento endodôntico não finalizado no dente 22. Durante a anamnese, relatou história de trauma há mais de dez anos e sem sintomatologia presente. Ao realizar exame clínico, verificou-se ausência de sintomatologia e resposta negativa ao teste de sensibilidade pulpar (frio) e uso de aparelho ortodôntico, sendo diagnosticada necrose pulpar. Um exame radiológico periapical inicial foi realizado, no qual se constatou a presença de reabsorção radicular e lesão perirradicular associada. Foi realizada anestesia com lidocaína a 2%, isolamento absoluto e irrigação com hipoclorito de sódio a 2,5% e instrumentação rotatória com o sistema Logic 40/06. A confirmação do comprimento de trabalho e patência foraminal com localizador foraminal Root Zx e irrigação final com EDTA agitado com inserto de ultrassom 25 IRRS. Após completo preparo químico-mecânico a obturação foi realizada com a inserção do MTA em sessão única. É possível concluir que o uso de MTA como material obturador de dentes com ápice incompleto mostrou-se eficiente, pois permitiu resolução do caso com sucesso e a manutenção do dente na arcada, exercendo suas funções primárias quanto à estética e à mastigação.

Palavras-chave: Perirradicular; Trauma; Reabsorção.