

## **CIRURGIA PARENDODÔNTICA DE UM INCISIVO LATERAL SUPERIOR COM LESÃO PERIAPICAL EXTENSA: RELATO DE CASO**

Maria Antônia Silva\*, Eduardo Fernandes Marques, Diana Rodrigues Frota  
Faculdade Presidente Antônio Carlos – FAPAC/ITPAC

### **Resumo**

A cirurgia parendodôntica é um dos recursos utilizados toda vez que não se consegue a remoção do agente etiológico via endodonto. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de cirurgia parendodôntica de um incisivo lateral superior com lesão periapical extensa. Paciente D.L.I.V.U apresentou-se com dor contínua na região do incisivo lateral superior esquerdo, o qual se encontrava com tratamento endodôntico prévio, lesão periapical, perda óssea lateral e apical extensa e possuínte de retentor intrarradicular e coroa metalocerâmica. Optou-se pela cirurgia parendodôntica pelo risco de fratura radicular na remoção do retentor intrarradicular e por possuir desvio apical no tratamento endodôntico prévio. Foi realizada anestesia com lidocaína, incisão e descolamento dos tecidos moles. Com o auxílio de uma broca tronco-cônica número 701, em alta rotação e sob abundante irrigação com soro fisiológico, foi realizado desgaste na cortical óssea vestibular, na região do elemento envolvido no sentido de unir-se com os pontos de rompimento da cortical óssea acometido pela própria lesão. Foi aberta uma loja óssea, no intuito de remover a lesão integralmente com a ajuda do dorso das curetas. Após a remoção de todo tecido envolvido na lesão, a apicectomia foi feita no sentido mesio-distal com intuito de formar um ângulo de 90° ao longo do eixo do dente nos 3 mm apicais e o MTA foi inserido para selamento apical. Concluiu-se que quando o tratamento endodôntico convencional não é capaz de solucionar o quadro infeccioso, a cirurgia parendodôntica torna-se uma alternativa viável.

**Palavras-chave:** Apicectomia; Lesão; Intrarradicular.