

REABILITAÇÃO ESTÉTICA DE INCISIVOS LATERAIS CONÓIDES

Luana Gonçalves Diniz*, Hérica Rocha de Oliveira, Brenda Souza Mendonça Oliveira,
Josleidany Borges, Marília Zeczkowski
Centro Universitário Luterano de Palmas – CEULP/ULBRA

Resumo

A anomalia de dentes conóides é uma alteração dentária que afeta a estética do sorriso. Essa anomalia origina-se durante a formação do órgão do esmalte, devido a uma alteração no padrão histológico, o que gera dentes em menores proporções. Nessa perspectiva, objetiva-se relatar um caso clínico de reanatomização de incisivos laterais conóides superiores, e harmonização do sorriso de uma paciente de 22 anos, gênero feminino, a qual compareceu na clínica odontológica do CEULP/ULBRA, com a queixa principal de: “dentes da frente pequenos” e a coloração amarelada. Dessa forma, após a anamnese, exame radiográfico e obtenção de diagnóstico, foram realizados os protocolos fotográficos intra e extrabucais, modelo de estudo, e planejamento digital das restaurações através da ferramenta do DSD (Digital Smile Design). Com isso, após a realização de clareamento caseiro, em 3 semanas, com gel clareador à base de peróxido de carbamida a 10%, foi realizada cirurgia de gengivoplastia para aumento de coroa clínica do dente 22 e por conseguinte harmonização dos arcos gengivais. Após este procedimento foi realizado a correção estética dos incisivos laterais conóides bilaterais, 12 e 22, utilizando a técnica direta com resina composta. O tratamento realizado no caso apresentou-se satisfatório, pois realizou-se técnicas minimamente invasivas para a obtenção do resultado esperado. Logo, a associação de técnicas conservadoras gerou bons resultados e foi considerada a melhor forma de tratamento para esse caso.

Palavras-chave: Estética; Anomalias; Odontologia.