

REABILITAÇÃO ESTÉTICA EM DENTE ANTERIOR FRATURADO POR MEIO DA COLAGEM DE FRAGMENTO AUTÓGENO: RELATO DE CASO CLÍNICO

Nayana Clitênia Silva Oliveira*, Rise Consolação Luata Costa Rank, Joana Estela Rezende Vilela, Alline Jesuino de Oliveira
Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC

Resumo

As fraturas de dentes anteriores permanentes são situações comuns no consultório odontológico. A colagem de fragmentos é considerada a alternativa mais conservadora para restaurar dentes anteriores fraturados. Além disso, restabelece as características morfológicas, mecânicas e estéticas. O presente trabalho teve como objetivo relatar um caso clínico de fratura coronária em incisivos centrais superiores em criança, no qual foi realizada a colagem de fragmento dental autógeno. Paciente de 11 anos de idade apresentou-se em clínica particular com fratura dos dentes 11 e 21, resultado de uma queda ao sair do banho. Pela necessidade de um procedimento restaurador conservador, a terapêutica de escolha foi a realização de uma colagem autógena imediata, devido a integridade e adaptação ao remanescente coronário. O exame clínico inicial mostrou uma fratura coronária, envolvendo esmalte e dentina, mas sem exposição pulpar. Em exame radiográfico, observou-se ausência de alteração no espaço periodontal e na tábua óssea adjacente. Tanto o remanescente quanto o fragmento dentário foram condicionados com ácido e aplicado sistema adesivo. A união entre as duas partes foi promovida por meio de resina composta. O excesso de material foi removido e o acabamento e polimento realizados. Assim, pode-se concluir que o cirurgião-dentista, frente a um traumatismo dental, deve atuar de forma imediata, com técnica e segurança, agindo de forma conservadora sempre que possível, a fim de devolver qualidade de vida ao paciente.

Palavras-chave: Colagem dentária; Estética dentária; Resinas compostas.