

ETIOLOGIA DA NEURALGIA TRIGEMINAL

Gustavo Antônio Bernardo Alves, Alef Vieira Galvão, Rufino José Klug
Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - UNITPAC

Resumo

A Neuralgia Trigeminal (NT) é um distúrbio neuropático, crônico, debilitante, definida por origem idiopática, representada por dor facial intensiva, restrita a um ou mais ramos do nervo trigêmeo, ou seja, incapacitante e de difícil controle. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre os fatores etiológicos que estão associados a NT. Realizou-se uma busca bibliográfica acerca do assunto nas bases de dados da Scielo nos últimos 5 anos. A NT se apresenta como uma dor paroxística, lancinante, unilateral, descrita em forma de “agulhada”, de início e fim bruscos. Este tipo de neuralgia não é letal, mas é apontada como uma das circunstâncias mais dolorosas popularmente. No entanto, ainda não foi determinado um único fator etiológico causador pelo surgimento da neuralgia, sabe-se que esteja relacionada a diversos fatores, tais como, compressão vascular, agentes infecciosos como o herpes simples, esclerose múltipla e até o comprometimento alveolar após a extração dentária, são alguns dos motivos expostos como responsáveis pela NT. Há duas escolhas de tratamento, o medicamentoso e cirúrgico, porém o medicamentoso é o mais apropriado com a intenção de evitar tratamento cirúrgico, optando pela neurocirurgia apenas em casos onde a terapêutica medicamentosa se mostre ineficiente ou acarrete efeitos colaterais graves. Desse modo, conclui-se que é necessário analisar os mecanismos de dor envolvidos para melhor compreensão da doença e conseqüente escolha de tratamento adequada. Assim, inicia-se o tratamento prematuro antes que o problema progrida e conseqüentemente concedendo uma melhor qualidade de vida para o paciente.

Palavras-chave: Causalgia; Diagnóstico; Nervo trigêmeo.